

-Heel**Folleto de información al Profesional****Belladonna-Heelaccord**

Solución Oral para Gotas.

Medicamento Homeopático
Hecho en Alemania**Composición:**

Cada 100 g de solución oral para gotas contiene: Atropa belladonna D2 0,5 g; Atropa belladonna D10 0,5 g; Atropa belladonna D30 0,5 g; Atropa belladonna D200 0,5 g; Atropa belladonna D1000 0,5 g; Echinacea angustifolia D10 0,5 g; Echinacea angustifolia D30 0,5 g; Echinacea angustifolia D200 0,5 g. Contenido en etanol: 35 % (vol.).

Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Alemana (HAB).

Presentación: Frasco cuentagotas con 30 ml de solución oral para gotas.**Indicaciones:** ~~Medicamento útil como coadyuvante~~ Medicamento útil como coadyuvante en el tratamiento de inflamaciones que cursan con infección.**Usos:** Amigdalitis, furúnculos.**Modo de uso:**

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas 3 veces al día.

Dosis pediátricas

Menor de 2 años 3 gotas 3 veces al día

2-5 años 5 gotas 3 veces al día

6-11 años 7 gotas 3 veces al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años:

10 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Pediatría:

Menor de 2 años, 3 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

2-5 años 5 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

6-11 años 7 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS

13 AGO 2014

N° Rel: MT 559587/14N° Registro: H-1202/12

Firma Profesional:

Método de administración:

Este medicamento debe tomarse alejado de las comidas. Para los niños, estas gotas se pueden tomar con una pequeña cantidad de agua

Vía de administración: Oral.**Advertencias:**

Úsese sólo por indicación médica. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia. No use dosis mayores ni por más tiempo de lo indicado por su médico.

Precauciones

Este medicamento contiene alcohol.

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes. No utilizar en enfermedades sistémicas como: tuberculosis, leucosis, colagenosis, esclerosis múltiple, enfermedad de SIDA, infecciones HIV y otras enfermedades autoinmunes, que requieren otro tipo de tratamiento.

Efectos secundarios: No se han descrito en la bibliografía.

Interacciones con otros medicamentos: No se conocen.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Reg. I.S.P. N°: H-1202/12

Bibliografía:

Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Homeopatía Antihomotóxica. Una farmacología selectiva; Vol. 1; 2ª Ed.; Aurelia-Verlag; Baden-Baden; 1991.
Vannier L., Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Editions Boiron, France, 1993. Monografías Oficiales de la Comisión D Alemana (de principios activos homeopáticos); Instituto Federal de Salud; Gacetas Federales, Bonn, Alemania.

Fabricado por y bajo licencia:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Elidoro Yáñez 1618
Santiago. Chile