

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG T R1
ANGINACID COMPRIMIDOS

PHARMAZEUTISCHE FABRIK
DR. RECKEWEG & CO
BENSHEIM LMH



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
<http://www.reckeweg.de>

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg T R1 Anginacid comprimidos

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: 1 comprimido contiene: Apis D6 13,7 mg, Belladonna D6 13,7mg, Calcium iodatum D12 13,7 mg, Kalium bichromicum D12 13,7 mg, Marum verum D6 13,7 mg, Mercurius sublimatus corrosivus D12 13,7 mg, Phytolacca D6 13,7 mg, Croscarmelosa sódica 3,0 mg, Estearato de magnesio 0,8 mg.

3. FORMA FARMACEITICA:

Comprimidos

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de catarros agudos de las mucosas de las vías respiratorias superiores y faringe.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Oral

En casos agudos, la dosis para adultos y niños a partir de 12 años es 1 comprimido hasta un máximo de 6 veces al día. En caso de mejoría de los síntomas, reducir la frecuencia de la dosis para 1 comprimido una a tres veces al día. Niños entre 6 y 12 años, después de consultar con su médico, toman 1 comprimido 3 veces al día. Después de la mejoría de los síntomas, reducir la frecuencia de la dosis para 1 comprimido una vez al día. Niños entre 1 y 6 años, después de consultar con su médico, toman 1 comprimido disuelto en agua 2 veces al día. Después de la mejoría de los síntomas, reducir la frecuencia de la dosis para 1 comprimido una vez al día.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG T R1

ANGINACID COMPRIMIDOS

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En enfermedades de tiroides este medicamento sólo debe usarse bajo vigilancia médica.

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

Durante el embarazo o la lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar Medicamentos.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG TR1 ANGINACID comprimidos, puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.

Puede producirse sialorrea después de utilizar el medicamento; en este caso, debe suspenderse el tratamiento.

4.9 Sobredosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A. Apis

Origen: animal

Usos medicinales: Inflamación exudativa, enrojecimiento e hinchazón de la mucosa de la faringe, dolor de garganta incluyendo las amígdalas.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG T R1

ANGINACID COMPRIMIDOS

B. Belladonna

Origen: vegetal

Usos medicinales: Enrojecimiento de la garganta con hinchazón. Membrana mucosa seca de la garganta. Congestion.

C. Calcium iodatum

CaI2 • 4 H2O

Origen: mineral

Usos medicinales: Hinchazón del tejido linfoide y de las mucosas, episodios recurrentes de catarro de las vías respiratorias superiores.

D. Kalium bichromicum

K2Cr2O7

Origen: mineral

Usos medicinales: Aumento de una secreción mucosa filamentosas, irritación inflamatoria, sensación de sequedad.

E. Marum verum

Origen: vegetal

Usos medicinales: Tos cosquillas seca y áspera.

F. Mercurius sublimatus corrosivus

Origen: mineral

Usos medicinales: Garganta de color rojo vivo, hinchazón de la garganta con dificultad para tragar, dolor ardiente, secreciones excoriantes.

G.- Phytolacca

Origen: vegetal

Usos medicinales: Hinchazón y enrojecimiento de la garganta. Dolor al tragar que se extiende hasta los oídos, pérdida de la voz, ronquera.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Frasco de vidrio con 200 comprimidos.

Frascos de vidrio (calidad hidrolítica tipo III) marrón.

Tapa de polietileno blanco

Cierre de seguridad de polietileno blanco

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG T R1

ANGINACID COMPRIMIDOS

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco a no más de 25 °C ~~30°C~~.

Fabricado en Alemania por:

Pharmazeutische Fabrik

Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D-64625 Bensheim ·

www.reckeweg.de

Importado ~~y Distribuido en Chile~~ por:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda.

Av. Presidente Riesco 5275, Dpto. 103

Las Condes

Santiago