

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****ECHIPROP D6  
COMPRIMIDOS****FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****ECHIPROP D6  
COMPRIMIDOS****1. COMPOSICIÓN**

Cada comprimido contiene:

Echinacea D4	1,5 mL
Propolis D4	1,5 mL
Celulosa Microcristalina, Estearato de Magnesio, Lactosa c.s.	

**2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA**

Medicamento Homeopático.

**3. MECANISMO DE ACCIÓN**

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

**4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.**

A continuación se describen las principales observaciones de la Patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

**Echinacea**: Tratamiento de apoyo en enfermedades infecciosas graves que cursan con fiebre.

**Propolis**: Inflamación no purulenta de las mucosas de vías aéreas. Enfermedades de la piel.

**5. INDICACIONES**

**Medicamento homeopático útil como** coadyuvante en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias tales como amigdalitis, rinitis, faringitis, síntomas del resfrío y estados gripales que puedan o no cursar con fiebre.

**6. CONTRAINDICACIONES**

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

**7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Se debe advertir al paciente, que durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales habitualmente desaparecen al continuar con el tratamiento. No obstante, si la agravación se prolonga más allá de una semana o si es muy severa, debe suspender la administración y consultar al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

ECHIPROP D6  
COMPRIMIDOS**8. EMBARAZO Y LACTANCIA**

No existen restricciones para el uso indicado.

**9. REACCIONES ADVERSAS**

No descritas.

**10. INTERACCIONES**

No descritas.

**11. TOXICOLOGÍA**

No descritas a estas diluciones.

**12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA**

**Vía de Administración:** Oral

**Posología:**

Adultos: en caso de molestias agudas administrar 1 comprimido cada una hora, hasta un máximo 12 veces al día.

Cuando mejoren los síntomas, administrar 1 comprimido 3 veces al día.

**Duración del Tratamiento:** No administrar por más de una semana. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

**Modo de Uso:** Ingiera junto con un vaso de agua. Se recomienda tomar el medicamento media hora antes o después de las comidas. Puede disolverse el comprimido en un poco de agua para facilitar la administración.

**13. PERIODO DE EFICACIA**

~~60~~ 36 meses

**14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 25 ~~30~~°C.

**15. CONDICIÓN DE VENTA**

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

**Elaborado y Distribuido** por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.  
([www.knop.cl](http://www.knop.cl))