

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ENGYSTOL COMPRIMIDOS

FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL**ENGYSTOL COMPRIMIDOS****VIA ORAL SUBLINGUAL****Composición:** 1 comprimido contiene:

Vincetoxicum hirundinaria D6	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria D10	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria D30	75,0 mg
Sulfur D4	37,5 mg
Sulfur D10	37,5 mg
Estearato de magnesio	1,5 mg



Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB)

Indicación

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones virales, tales como estados gripales.

Advertencias

Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes con intolerancia a la lactosa y diabéticos.

Si los síntomas persisten luego de 15 días de tratamiento, consulte al médico.

Modo de empleo : En general, dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido 3 veces al día por 2 semanas o hasta desaparición de los síntomas.

Posología:

Grupo de edad	Dosis normal	Dosis aguda
Niños 1-6 años	Previa consulta al médico disolver bajo la lengua, ½ comprimido 3 veces al día.	Previa consulta al médico disolver bajo la lengua ½ comprimido cada media a una hora hasta un máximo de 12 veces al día
Niños de 6-12 años	Disolver debajo de la lengua 1 comprimido 2 veces al día	Disolver 1 comprimido cada media a una hora hasta 8 veces al día
Niños > 12 años	Dosis de adulto	Dosis adulto

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ENGYSTOL COMPRIMIDOS

Indicaciones de uso: No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas

Tomar distanciado 15 minutos de las comidas.

Contraindicaciones: No se han descrito en la bibliografía

Efectos secundarios: En casos aislados o poco frecuentes, puede producir lo siguiente: Malestares estomacales, prurito en manos, pies y pecho, hinchazón de labios, dolor esofágico, insomnio.

Interacciones con otros medicamentos: No se han descrito en la bibliografía

Precauciones

Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes con intolerancia a la lactosa y diabéticos.

Uso durante el embarazo y lactancia:

Al igual que todos los medicamentos, los productos homeopáticos también deben utilizarse bajo supervisión médica

Uso en niños:

No está suficientemente documentado el uso de este medicamento en niños menores de un año.

Por lo tanto, no usar en niños, menores de 1 año.

Presentación

Envase de 50 x comprimidos

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Marca registrada.

Bibliografía :

- German Homeopathic Pharmacopoeia; First Editon 1978
- Vannier Poirier J ; Precis de Matiene Medicale Homeopathique ; Ed Boiron 1985
- Reckeweg H-H ; Materia Médica ; Vol 1, Aurelia Verlag ; baden-Baden ; 1991

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4



Ref.: MT410274/13

Reg. I.S.P. N° H-530/10

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ENGYSTOL COMPRIMIDOS**

D-76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Av. Eliodoro Yáñez 1618

Providencia - Santiago, Chile



