

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

FLUK GLÓBULOS

FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**SANAKIND® RESFRÍOS FLUK  
GLÓBULOS****1. COMPOSICIÓN.**

Cada 100 g de glóbulos contiene:

Aconitum napellus C6	0,20 mL
Eucalyptus globulus C6	0,20 mL
Eupatorium perfoliatum C6	0,20 mL
Kalium jodatum C6	0,20 mL
Pulsatilla pratensis C6	0,20 mL
Glóbulos de Sacarosa	100 g

**2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA**

Medicamento Homeopático.

**3. MECANISMO DE ACCIÓN**

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

**4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.**

A continuación se describen las principales observaciones de la patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

**Aconitum napellus**: Enfermedades inflamatorias agudas.**Eucalyptus globulus**: Inflamación del tracto respiratorio.**Eupatorium perfoliatum**: Gripe, enfermedades febriles similares a la gripe.**Kalium jodatum**: Inflamación de las vías aéreas superiores.**Pulsatilla pratensis**: Inflamación de las vías respiratorias, resfriado.**5. INDICACIONES****Medicamento homeopático útil como coadyuvante** en el tratamiento de los síntomas de estados gripales y prevención de resfríos a repetición en niños.**6. CONTRAINDICACIONES**

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

**7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****FLUK GLÓBULOS**

Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales desaparecerán al continuar con el tratamiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

**8. EMBARAZO Y LACTANCIA**

No existen restricciones para el uso indicado.

**9. REACCIONES ADVERSAS**

No descritas.

**10. INTERACCIONES**

No descritas.

**11. TOXICOLOGÍA**

No descritas a estas diluciones.

**12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA**

**Vía de Administración:** Uso Oral

**Posología:**

Niños menores de 1 año de edad: en caso de molestias agudas, administre 3 glóbulos cada hora hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoren las molestias, administre 5 glóbulos 3 veces por día.

Niños entre 1 y 6 años de edad: en caso de molestias agudas, administre 5 glóbulos cada hora, hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoran las molestias, administre 8 glóbulos 3 veces al día.

Niños entre 6 y 12 años de edad: en caso de molestias agudas, administre 8 glóbulos cada hora, hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoran las molestias, administre 10 glóbulos 3 veces al día.

**Duración del Tratamiento:** Si no hay mejoría en un plazo de una semana o si presentan otros síntomas, se debe suspender su uso y consulte médico.

**Modo de Uso:** Los glóbulos deben tomarse media hora antes o media hora después de las comidas, permitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. En bebés y niños muy pequeños disuelva los glóbulos en un poco de agua antes de su administración.

**13. PERIODO DE EFICACIA**

~~60~~ **24** meses

**14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 25°C.

**15. CONDICIÓN DE VENTA**

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

**Elaborado y Distribuido** por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.  
([www.knop.cl](http://www.knop.cl))

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL