

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONALGRIPP-HEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**-Heel**Folleto de Información al Profesional

X comprimidos sublinguales

Gripp-Heel comprimidos sublinguales

Medicamento homeopático
Hecho en Alemania

Composición:

Cada comprimido sublingual contiene: Aconitum napellus D4 120 mg; Bryonia cretica D4 60 mg; Lachesis mutus D12 60 mg; Eupatorium perfoliatum D3 30 mg; Phosphorus D5 30 mg. Como excipientes: lactosa y estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Indicaciones: Coadyuvante en el tratamiento de estados gripales.

Modo de uso:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas


Menor de 2 años	1 comprimido una vez al día
2 - 5 años	1 comprimido 1 a 2 veces <u>1 vez</u> al día
6 -11 años	1 comprimido 2 veces al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años y mayores

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Dosis Pediátrica Aguda:

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS	
14 OCT 2014	
N° Ref.:	MT 538837/14
N° Registro:	H-727/10
Firma Profesional:	

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**GRIPP-HEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES****-Heel**

Menor de 2 años, 1 comprimido cada $\frac{1}{2}$ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2 - 5 años, 1 comprimido cada $\frac{1}{2}$ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

6 -11 años, 1 comprimido cada $\frac{1}{2}$ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Contraindicaciones:

- Antecedentes de alergia al medicamento o a alguno de sus componentes.
- No administrar durante el embarazo y la lactancia.

Efectos secundarios:

- No se han descrito en la bibliografía.
En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Interacciones con otros medicamentos:

- Los efectos de un medicamento pueden alterarse al usarlos con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Advertencias:

- Puede producirse un agravamiento inicial de los síntomas al inicio del tratamiento, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.
- No use dosis mayores ni por más tiempo de lo recomendado. Si los síntomas persisten o empeoran luego de tres días de tratamiento, consulte al médico.
- Proteger del calor, la luz solar directa y la humedad.
- Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.

Precaución:

- Este medicamento contiene lactosa.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

GRIPP-HEEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

-Heel

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Vía de administración: Sublingual.

Condiciones de Almacenamiento:

- Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 25° C, protegido de la luz y la humedad.
- Cerrar el frasco de las gotas inmediatamente después de su uso.
- No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

Bibliografía:

German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978.

Vannier; Poirier J.; Precis de Matière Medicale Homeopathique, Ed. Boiron, 1985.

Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

Reg. I.S.P. N°.:H-727

Fabricado por y bajo licencia

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Eliodoro Yáñez 1618
Providencia - Santiago . Chile