

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
KOLIK GLÓBULOS



**FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

**KOLIK**  
**GLÓBULOS**

**1. COMPOSICIÓN.**

Cada 100 g de glóbulos contiene:

<i>Anamirta cocculus</i> C6	0,33 mL
<i>Petroleum crudum</i> C6	0,33 mL
<i>Strychnos nux vomica</i> C6	0,33 mL
Glóbulos de Sacarosa	100 g

**2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA**

Medicamento Homeopático.

**3. MECANISMO DE ACCIÓN**

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

**4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.**

A continuación se describen las principales observaciones de la patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

**Anamirta cocculus**: para trastornos nerviosos o del estado de ánimo por falta de sueño.

**Petroleum crudum**: Inflamación del tracto gastrointestinal.

**Strychnos nux vomica**: Inflamación y espasmos del tracto gastrointestinal. Molestias debido a la alimentación. Estreñimiento.

**5. INDICACIONES**

**Medicamento homeopático útil como coadyuvante** en el tratamiento de síntomas de malestares gastrointestinales en niños y lactantes, en especial cólicos de origen digestivo.

**6. CONTRAINDICACIONES**

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

**7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales desaparecerán al continuar con el tratamiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

**8. EMBARAZO Y LACTANCIA**

No existen restricciones para el uso indicado.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
KOLIK GLÓBULOS**



**9. REACCIONES ADVERSAS**

No descritas.

**10. INTERACCIONES**

No descritas.

**11. TOXICOLOGÍA**

No descritas a estas diluciones.

**12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA**

**Vía de Administración:** Uso Oral

**Posología:**

Niños menores de 1 año de edad: en caso de molestias agudas, administre 3 glóbulos cada hora hasta un máximo de 12 veces al día.  
Cuando mejoren las molestias, administre 5 glóbulos 3 veces por día.

Niños entre 1 y 6 años de edad: en caso de molestias agudas, administre 5 glóbulos cada hora, hasta un máximo de 12 veces al día.  
Cuando mejoren las molestias, administre 10 glóbulos 3 veces por día.

Niños entre 6 y 12 años de edad: en caso de molestias agudas, administre 8 glóbulos cada hora, hasta un máximo de 12 veces al día.  
Cuando mejoren las molestias, administre 10 glóbulos 3 veces por día.

**Duración del Tratamiento:** Si no hay mejoría en un plazo de 2 a 3 días o si presentan otros síntomas tales como fiebre, vómitos, diarrea o dejan de comer, debe suspender su uso y consultar a su médico.

**Modo de Uso:** Los glóbulos deben tomarse media hora antes o media hora después de las comidas, permitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. En bebés y niños muy pequeños disuelva los glóbulos en un poco de agua antes de su administración.

**13. PERIODO DE EFICACIA**

24 meses

**14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Conservar a no más de 25°C.

**15. CONDICIÓN DE VENTA**

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

**Elaborado y Distribuido** por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.  
([www.knop.cl](http://www.knop.cl))