
	<b>FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL</b>	<b>Pág. 1 de 6</b>
	<b>MEDIFORM 89</b>	

### 1. Fórmula:

Cada 100 mL contiene

Baptisia	D6	20 mL
Bryonia	D6	20 mL
Colocynthis	D6	20 mL
Dioscorea	D6	20 mL
Ignatia	D6	20 mL

Excipiente: Alcohol




### 2. Acción clínica-farmacológica homeopática

La prescripción de los medicamentos en homeopatía va orientada a curar a la persona enferma y por tal motivo utiliza aquellos medicamentos capaces de cubrir la totalidad de la sintomatología que padece el paciente. Pero, también es posible conseguir el alivio de una dolencia en particular usando aquellos medicamentos homeopáticos que tienen un tropismo hacia el área que se desea tratar, lo que ha dado origen a medicamentos para tratar patologías específicas. Es bajo esta perspectiva que **MEDIFORM 89** solución para gotas orales, se formuló orientando su acción hacia los trastornos de origen gastrointestinal, específicamente el **Síndrome del Intestino Irritable (SII) y Gastritis**, actuando como coadyuvante en el tratamiento de la sintomatología de esta patología.

De acuerdo a la Organización Mundial de Gastroenterología, el **SII** se puede definir como un trastorno intestinal funcional en el que la defecación se acompaña de dolor o



	<b>FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL</b>	<b>Pág. 2 de 6</b>
<b>MEDIFORM 89</b>		

molestia abdominal o alteraciones del hábito del movimiento intestinal. Es frecuente que se acompañe de hinchazón, distensión y alteraciones de la defecación. [1]

El **SII** se caracteriza por la presencia de una serie de síntomas clínicos que se resumen a continuación: [1,2]

Dolor abdominal que puede localizarse en el epigastrio ó hipogastrio, siendo intensificado por la comida y el estrés, aliviándose con la eliminación de gases y deposiciones.

Estreñimiento alternado con diarrea es otro de los síntomas característicos de esta patología, generalmente con predominio de uno de los dos. La diarrea puede agravarse por el estrés o consumo de comida.

Distensión abdominal e incremento de flatulencia atribuidos a una tolerancia reducida a la distensión.

Si bien la etiología exacta de la enfermedad no es por completo conocida, es sabido que disfunciones a nivel del sistema nervioso central, trastornos psicológicos o el estrés son los factores causantes de esta patología. [1,2]

~~Por otra parte, la Gastritis, patología que afecta a una gran cantidad de personas en nuestro país, presenta síntomas que afectan de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Los síntomas más característicos son: acidez estomacal, dolor epigástrico, flatulencia, dolor abdominal y náuseas. [3,4]~~

Los componentes de **MEDIFORM 89** actúan a nivel del estómago e intestino aliviando y mejorando la sintomatología del SII ~~y la Gastritis~~. Estas diluciones

	<b>FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL</b>	<b>Pág. 3 de 6</b>
<b>MEDIFORM 89</b>		


homeopáticas presentan una gran actividad a nivel del sistema gastrointestinal, tal como se describe en las diversas materias médicas homeopáticas.

Es importante considerar que no se han descrito para los componentes de **MEDIFORM 89**, en esas diluciones, efectos adversos ~~ni contraindicaciones~~, lo que da seguridad para usarlo como coadyuvante en los diversos tratamientos que habitualmente se utilizan para estas patologías

A continuación se exponen las propiedades farmacológicas de cada una de las diluciones homeopáticas que conforman la asociación del producto **MEDIFORM 89**:

- **Dioscorea D6**: Se utiliza en el tratamiento de la hiperestesia que se produce a nivel de los nervios del plexo solar y umbilical, que produce neurosis estomacal e intestinal, generando con ello espasmos, diarrea y dolor gastrointestinal. De esta manera, Dioscorea D6 actúa aliviando los cólicos producidos por los espasmos y la diarrea de origen nervioso, regulando la motilidad del tracto gastrointestinal. [5]
- **Colocinthys D6**: Este medicamento homeopático actúa principalmente aliviando el dolor espasmódico y paroxístico que se produce a nivel intestinal, siendo de esta manera muy útil en la neurosis intestinal que se produce en el Síndrome del Intestino Irritable. Especialmente indicado cuando los cólicos y diarreas aparecen inmediatamente después de un trastorno emocional importante. [5,6]
- **Bryonia D6**: Actúa en el alivio de la distensión abdominal dolorosa, malestar estomacal y flatulencia, en gastralgias después de comer y gastralgias con sensación de ardor y pesadez. Además es útil en casos de diarrea por cambios en la dieta y en la constipación con inactividad rectal. [5,8]

**FOLLETO DE INFORMACION  
AL PROFESIONAL**

	<b>FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL</b>	<b>Pág. 4 de 6</b>
	<b>MEDIFORM 89</b>	

- **Baptisia D6:** Esta dilución homeopática se caracteriza por aliviar: el malestar y la sensación de vacío en el estómago, distensión abdominal, timpanismo y borborigmos. [8]
- **Ignatia D6:** Mejora la distensión abdominal, aliviando el dolor y la flatulencia. Ignatia ejerce un efecto antiespasmódico del tracto gastrointestinal especialmente en los cólicos. Además actúa como coadyuvante en el alivio de la sensación de vacío en el epigastrio, pesadez y distensión estomacal, dolor en el epigastrio, sensación de quemadura en el estómago, calambres abdominales, borborigmos y constipación.

Una característica importante de Ignatia es su acción sobre trastornos de origen emocional que desencadenan o agravan los síntomas mencionados. [5,8]

**3. Indicación: medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento sintomático del Síndrome de Intestino Irritable.**

**4. Contraindicaciones:**

**No utilizar cuando existen antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.**

~~No se han registrado.~~

**5. Advertencias:**

**-Este medicamento es para el uso exclusivo en adultos**

**-Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia.**

**6. Interacciones:**

**El efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros.**

**Se debe evitar administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral.**

~~No se han registrado.~~



	<b>FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL</b>	<b>Pág. 5 de 6</b>
	<b>MEDIFORM 89</b>	

**7. Reacciones adversas:**

No se han registrado.

**6. Vía de Administración:**

- Vía Oral. Solución para gotas orales

- Dosificación Adulto:

Dosis habitual diaria: **es 10 gotas cada 8 horas (1 a 3 veces al día)** hasta desaparición de las molestias.

**En estados agudos: administrar 10 gotas cada media o una hora, máximo 12 veces al día, para luego continuar con 10 gotas 1 a 3 veces al día.**

~~En estados de crisis aguda 15 gotas cada 8 Hrs~~

Si los síntomas persisten por más de 5 días debe consultar a su médico

- Forma de cómo se debe administrar


Se administra por vía oral, colocando las gotas en un vaso que contenga no más de una cucharadita de agua.


**7. Precauciones**

No dejar al alcance de los niños

**8. Efectos adversos**

No se han registrado.



	<b>FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL</b>	<b>Pág. 6 de 6</b>
	<b>MEDIFORM 89</b>	

**9. Presentación:**

Frascos de 30 mL. Solución para gotas orales

**10. Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, a una temperatura no mayor a 25° C, en un ambiente seco.

**BIBLIOGRAFÍA**

- [1] Practice Guideline Irritable bowel síndrome, World Gastroenterology Organization, 2009.
- [2] Harrison, Principios de Medicina Interna, 15<sup>va</sup> edición, Editado por McGraw Hill, 2002.
- [3] M Gonzalez B. Tratado de Medicina Paliativa, 2<sup>da</sup> edición, editorial panamericana, 2006.
- [4] L Sholtis B, S Smeltze C. Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing, 12VA Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
- [5] Physiological Materia Medica, Jain Publishing CO, 1978.
- [6] Matière Médicale Homéo-pathique pour la pratique quotidienne, 2<sup>da</sup> édition, camugli, 1979.
- [7] Matière Médicale Homéopatique, édition des laboratoires boiron, 1978, pág. 44-46.
- [8] Vijnovsky, Bernardo - Tratado de Materia Médica Homeopática, Editado en Buenos Aires, 1997.
- [9] Monografía de la Comisión D, ministerio de salud alemán, 1985.

