

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
PANADOL EXTRA ADVANCE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

PANADOL^{MR} Extra Advance

Paracetamol 500 mg/Cafeína 65 mg

FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL

1. Composición :

Cada comprimido recubierto contiene : Paracetamol 500 mg, Cafeína 65 mg.
 Excipientes: Almidon pregelatinizado, Povidona K25, Carbonato de calcio, Crospovidona, Acido Algínico, Estearato de magnesio, Metilparabeno, Etilparabeno Propilparabeno, Dioxido de titanio, Hipromelosa 3cP/6cP, Macrogol 100, Polisorbato 80.

2. Clasificación:

Analgésico - Antipirético

3. Indicaciones:

Tratamiento del dolor leve a moderado.

~~Panadol Extra Advance~~ contiene paracetamol, que es un analgésico y antipirético, y cafeína, un adyuvante del efecto analgésico del paracetamol. La especial formulación de ~~Panadol Extra Advance~~ produce una mayor eficacia analgésica. La combinación de paracetamol y cafeína potencia el efecto analgésico, brindando un alivio más efectivo del dolor y levanta el ánimo.

4. Usos:

Panadol Extra Advance contiene paracetamol, que es un analgésico y antipirético, y cafeína, un adyuvante del efecto analgésico del paracetamol. La especial formulación de Panadol Extra Advance produce una mayor eficacia analgésica. La combinación de paracetamol y cafeína potencia el efecto analgésico, brindando un alivio más efectivo del dolor y levanta el ánimo.

Panadol Extra Advance es eficaz en el tratamiento del dolor leve a moderado incluyendo:

- Dolor de Cabeza
- Migraña
- Dolores de Espalda
- Dolor muscular
- Dismenorrea
- Dolor de garganta

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 07 ABR 2014 </div>
N° Ref.: RF482974/13 N° Registro: F-20997/14 Firma Profesional: <i>[Firma]</i>

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**PANADOL EXTRA ADVANCE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS**

- Fiebre y dolor después de haber sido vacunado
- Dolor post tratamientos dentales / extracción dental
- Dolor dental
- Dolor por Osteoartritis

Panadol Extra Advance sus comprimidos recubiertos formulados con tecnología Optizorb, se dispersan más rápido que un Panadol Extra Regular. **Panadol Extra Advance** se absorbe-desintegra en solo 10 minutos. ~~Panadol Extra Advance~~ entrega un 37% más de alivio del dolor que un Paracetamol Regular.

5. Dosis y modo de uso :

Adultos y niños mayores de 12 años : 1 a 2 comprimidos recubiertos 3 a 4 veces al día. No administrar más de 4 gramos diarios (8 comprimidos recubiertos). Mantenga un intervalo de dosis mínima de 4 hrs. No exceda la dosis recomendada. No tome con otros productos que contengan paracetamol. No administrar a niños menores de 12 años.

6. Contraindicaciones:

- No administrar si Ud es alérgico al paracetamol, cafeína, para-hidroxibenzoatos o a algún otro ingrediente de la composición.
- Pacientes que sufren enfermedad hepática o renal grave y alcoholismo.

8. Advertencias y precauciones:

- a) No administrar por más de cinco días en caso de dolor, por más de tres días en caso de fiebre, o por más de dos días en caso de dolor de garganta, sin consultar al médico.
- b) El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol puede provocar severo daño hepático. Consulte con su médico antes de usar este medicamento si tiene problemas de hígado o riñón.
- c) Este medicamento contiene cafeína. Cuando tome este medicamento evite el consumo excesivo de bebidas o productos que contienen cafeína (por ejemplo, té, café y bebidas enlatadas). La alta ingesta de cafeína puede provocar dificultad para dormir, temblores y una sensación de malestar en el pecho causado por latidos acelerados del corazón.
- d) Consulte con el médico si sus síntomas no mejoran.
- e) No administrar a niños menores de 12 años.
- f) Mantener a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños.
- g) No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.
- h) Paracetamol puede causar efectos dermatológicos graves potencialmente fatales, aunque poco frecuentes, como Síndrome de Stevens Johnson, Necrolisis Epidérmica Tóxica y Exantema Pustuloso agudo Generalizado. Cuando prescriba Paracetamol, indique a sus pacientes como reconocer y reaccionar a tiempo en caso de manifestar reacciones cutáneas graves, e instrúyales acerca de que deben discontinuar el

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**PANADOL EXTRA ADVANCE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS**

Paracetamol a la primera aparición de erupción a la piel u otro signo de hipersensibilidad.

- i) Paracetamol en sobredosis, puede causar efectos hepatotóxicos graves, potencialmente fatales. Cuando prescriba Paracetamol, indique a sus pacientes que es importante mantener este medicamento lejos del alcance de los niños, y que debe acudir por ayuda médica inmediatamente si accidental o intencionadamente se ingiere una cantidad significativamente superior a la prescrita (150 mg/kg en niños menores de 12 años o 7.5 gramos totales en adultos y niños mayores de 12 años).
- j) Informe a sus pacientes que Paracetamol puede presentarse como ingrediente único o en asociación, para tratar síntomas de resfrios, tos, alergias, entre otros, bajo diferentes denominaciones comerciales.
- k) El consumo excesivo de Alcohol se debe evitar durante el tratamiento con Panadol Extra Advance, ya que, el consumo conjunto aumenta la posibilidad de toxicidad hepática

Precaución: Producto potencialmente hepatotóxico, que además puede causar reacciones graves a la piel.

7. Efectos adversos:

Suspenda el uso de este medicamento y consulte a su médico inmediatamente si:

- Aparece algún tipo de reacción alérgica como erupción cutánea o picazón o descamación de la piel, con o sin dificultades para respirar, o hinchazón de los labios, lengua, garganta o cara, o úlceras en la boca.
- Ud. ha experimentado dificultad respiratoria con Acido Acetilsalicílico u otros AINEs y experimenta una reacción similar con este producto.
- Presenta sangrado sin causa aparente.

Estas reacciones son raras.

8. Interacciones:

Antes de tomar este medicamento consulte con su médico si Ud, esta tomando Warfarina o otros medicamentos anticoagulantes similares.

9. Sobredosificación :

En caso de sobredosis consultar al médico o concurrir al hospital más cercano debido al riesgo de falla hepática.

10. Condiciones de almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente, lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No recomiende este medicamento a otra persona.

