

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL SAL DE FRUTA ENO LIMÓN

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL ENO^{MR} LIMÓN SAL DE FRUTA ANTIACIDO

Vía de Administración: Oral

Cada 100 g de polvo efervescente sabor limón contiene:

Bicarbonato de sodio 46,22 g

Ácido cítrico anhidro 42,7 g


Carbonato de sodio anhidro 10,00 g

Sacarina sódica 0,080 g

Colorante D & C amarillo N° 10, sabor limón.

Cada sobre de 5 g contiene 0,004 g de sacarina

Cada sobre de 5 g contiene 0,85 g de sodio.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS
28 JUN 2012
N° Ref.: <u>MT331602/12</u>
N° Registro: <u>F-4225/10</u>
Firma Profesional: 

Clasificación: Antiácido refrescante

Indicaciones:

Alivio sintomático y temporal de las molestias derivadas de la hiperacidez estomacal.

Contraindicaciones

No tome este medicamento si Ud. es alérgico a este medicamento o a alguno de sus componentes: al bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, ácido cítrico o a alguno de los otros componentes de la fórmula. Si tiene problemas hepáticos, cardíacos o renales, presión arterial elevada, hipocalcemia, dolor abdominal, vómitos, fiebre, úlceras. Sigue una dieta baja en sodio

Embarazo y Lactancia: Consulte a su médico si usted está embarazada o está amamantando.

Precauciones y Advertencias

a) Interacciones

~~El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacción). Es muy importante que consulte con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento si está tomando otro.~~

~~Las personas con una dieta sodio restringida deben consultar al médico antes de tomar este producto.~~

~~En caso de requerir atención médica por otras razones no olvide mencionar que está tomando este medicamento.~~

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SAL DE FRUTA ENO LIMÓN**

Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos

Precauciones y Advertencias

En caso de sufrir alguna enfermedad, tomar otros medicamentos o requerir atención médica por otras razones, consulte con el médico antes de tomar este medicamento

No tome este medicamento por más de 14 días, si los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico. No exceda la dosis indicada.

b) Presencia de otras enfermedades

~~El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al médico antes de ingerir este medicamento.~~

~~e) No tome este medicamento sin antes consultar al farmacéutico si Ud. presenta alguna alergia ya sea a otro medicamento, colorante, edulcorante o saborizante.~~

~~d) No tome este medicamento por más de 14 días, si los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico.~~

Efectos adversos (no deseados):

No serios: irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases e hinchazón.

~~Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toma por un período prolongado de tiempo y/o en dosis grandes.~~


~~ENO es generalmente bien tolerado y seguro.~~

~~Casualmente se puede presentar los efectos siguientes debido a sus propiedades farmacológicas: Eructos (se considera un efecto beneficioso), flatulencia, distensión abdominal (debido a la liberación de anhídrido carbónico).~~

~~Si se consumió en cantidades excesivas, la presencia de bicarbonato de sodio puede causar los calambres del estómago, eructos y flatulencia así como carga excesiva de sodio o alcalosis metabólica. Estas molestias desaparecen al suspender el medicamento.~~

Sobredosis:

En caso de sobredosis consultar al médico o concurrir al hospital más cercano



**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SAL DE FRUTA ENO LIMÓN**

Dosis y forma de administración:

Los adultos y niños mayores de 12 años: 5 g (un sahet sobre o una cucharada de 5 ml de polvo) disuelto en un vaso de agua.

La dosificación puede repetirse cada 2- 3 horas hasta ~~cinco~~ 2 veces al día.

Intervalo mínimo de dosificación: 2 horas.

La dosis diaria máxima (DDM): ~~5~~ 2 sobres de 5 g.

El periodo máximo de uso de antiácidos a DDM es de 14 días.

Condiciones de Almacenamiento:

Guarde en un lugar seco y a temperatura menor de ~~25°C~~ 30°C.

~~Las botellas: guarde el recipiente firmemente cerrado.~~

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No recomiende este medicamento a otra persona.

